



CPIN
Canadian
Primary Care
Information
Network

RCIP
Réseau canadien
d'information pour
les cliniques de
première ligne

Saignements en début de grossesse : ce que vous devez savoir

Il peut être effrayant de voir du sang en début de grossesse. Il est important de savoir que de légers saignements ou des pertes légères sont fréquents au cours du premier trimestre. Dans de nombreux cas, cela ne signifie pas une fausse couche (perte de grossesse).

De légers saignements peuvent survenir lorsque l'ovule fécondé se fixe à l'utérus, ce qu'on appelle l'implantation. Ils peuvent également se produire parce que le col de l'utérus devient plus sensible et plus irrigué pendant la grossesse. Après un rapport sexuel ou un examen gynécologique, de légers saignements peuvent apparaître.



Cependant, les saignements en début de grossesse peuvent parfois être le signe d'une fausse couche.

Les fausses couches sont plus fréquentes au cours du premier trimestre et sont souvent inévitables.

Les saignements peuvent également être le signe d'une grossesse extra-utérine, qui survient lorsque la grossesse se développe en dehors de l'utérus. Une grossesse extra-utérine peut être grave et nécessite des soins médicaux urgents.

Veillez consulter immédiatement les urgences si vous présentez des saignements abondants (au point d'imbiber une serviette hygiénique par heure pendant 2 heures ou plus), des douleurs abdominales basses intenses, de la fièvre, des frissons, des vertiges ou si vous vous sentez faible. Ces symptômes nécessitent une évaluation urgente. Même un saignement léger doit être signalé.

Pour plus
d'informations,
[cliquez ici](#)